

# Preliminarii

Mihai-Sorin Stupariu

Sem. I, 2016 - 2017

# Introducere

- ▶ Geometria computațională: *complexitatea computațională a problemelor geometrice în contextul analizei algoritmilor* [Lee & Preparata, 1984]

# Introducere

- ▶ Geometria computațională: *complexitatea computațională a problemelor geometrice în contextul analizei algoritmilor* [Lee & Preparata, 1984]
- ▶ Complexitatea: memorie, timp, calcule

# Introducere

- ▶ Geometria computațională: *complexitatea computațională a problemelor geometrice în contextul analizei algoritmilor* [Lee & Preparata, 1984]
- ▶ Complexitatea: memorie, timp, calcule
- ▶ Probleme abordate: acoperiri convexe, proximitate, intersecții, căutare, etc.

# Introducere

- ▶ Geometria computațională: *complexitatea computațională a problemelor geometrice în contextul analizei algoritmilor* [Lee & Preparata, 1984]
- ▶ Complexitatea: memorie, timp, calcule
- ▶ Probleme abordate: acoperiri convexe, proximitate, intersecții, căutare, etc.
- ▶ Tehnici utilizate: construcții incrementale, divide et impera, plane-sweep, transformări geometrice, etc.

# Introducere

- ▶ Geometria computațională: *complexitatea computațională a problemelor geometrice în contextul analizei algoritmilor* [Lee & Preparata, 1984]
- ▶ Complexitatea: memorie, timp, calcule
- ▶ Probleme abordate: acoperiri convexe, proximitate, intersecții, căutare, etc.
- ▶ Tehnici utilizate: construcții incrementale, divide et impera, plane-sweep, transformări geometrice, etc.
- ▶ Domenii de aplicabilitate: grafică pe calculator, pattern recognition, robotică , statistică, cercetări operaționale

## Criterii numerice – poziția relativă a unor puncte

- ▶ Stabilirea unor relații între puncte / ordonare

## Criterii numerice – poziția relativă a unor puncte

- ▶ Stabilirea unor relații între puncte / ordonare
- ▶ **Context 1D**



## criterii numerice – poziția relativă a unor puncte

- ▶ Stabilirea unor relații între puncte / ordonare
- ▶ **Context 1D**
  - ▶ ordonare (**relativ la un sistem de coordonate**)

## criterii numerice – poziția relativă a unor puncte

- ▶ Stabilirea unor relații între puncte / ordonare
- ▶ **Context 1D**
  - ▶ ordonare (**relativ la un sistem de coordonate**)
  - ▶ raport (**independent de alegerea unui sistem de coordonate**)

# Criterii numerice – poziția relativă a unor puncte

- ▶ Stabilirea unor relații între puncte / ordonare
- ▶ **Context 1D**
  - ▶ ordonare (**relativ la un sistem de coordonate**)
  - ▶ raport (**independent de alegerea unui sistem de coordonate**)
- ▶ **Context 2D**


# Criterii numerice – poziția relativă a unor puncte

- ▶ Stabilirea unor relații între puncte / ordonare
- ▶ **Context 1D**
  - ▶ ordonare (**relativ la un sistem de coordonate**)
  - ▶ raport (**independent de alegerea unui sistem de coordonate**)
- ▶ **Context 2D**
  - ▶ ordonare (**relativ la un sistem de coordonate** – posibile alegeri: coordonate carteziene, coordonate polare)


# Criterii numerice – poziția relativă a unor puncte

- ▶ Stabilirea unor relații între puncte / ordonare
- ▶ **Context 1D**
  - ▶ ordonare (**relativ la un sistem de coordonate**)
  - ▶ raport (**independent de alegerea unui sistem de coordonate**)
- ▶ **Context 2D**
  - ▶ ordonare (**relativ la un sistem de coordonate** – posibile alegeri: coordonate carteziane, coordonate polare)
  - ▶ testul de orientare (**independent de alegerea unui sistem cartezian de coordonate**)

# Vectori și puncte



Combinatii liniare  
 $\alpha v + \beta w$  ( $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ )



Combinatii afine  
 $\lambda A + \mu B$  ( $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  și  $\lambda + \mu = 1$ )

## Conceptul de raport

- **Lemă** Fie  $A$  și  $B$  două puncte distincte în  $\mathbb{R}^n$ . Pentru orice punct  $P \in AB$ ,  $P \neq B$  există un unic scalar  $r \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  astfel ca  $\overrightarrow{AP} = r \overrightarrow{PB}$ . Reciproc, fiecărui scalar  $r \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , îi corespunde un unic punct  $P \in AB$ .

## Conceptul de raport

- ▶ **Lemă** Fie  $A$  și  $B$  două puncte distincte în  $\mathbb{R}^n$ . Pentru orice punct  $P \in AB$ ,  $P \neq B$  există un unic scalar  $r \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  astfel ca  $\overrightarrow{AP} = r \overrightarrow{PB}$ . Reciproc, fiecărui scalar  $r \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , îi corespunde un unic punct  $P \in AB$ .
- ▶ **Definiție** Scalarul  $r$  definit în lema anterioară se numește **raportul** punctelor  $A, B, P$  (sau **raportul în care punctul  $P$  împarte segmentul  $[AB]$** ) și este notat cu  $r(A, P, B)$ .



## Conceptul de raport

- ▶ **Lemă** Fie  $A$  și  $B$  două puncte distincte în  $\mathbb{R}^n$ . Pentru orice punct  $P \in AB$ ,  $P \neq B$  există un unic scalar  $r \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  astfel ca  $\overrightarrow{AP} = r \overrightarrow{PB}$ . Reciproc, fiecărui scalar  $r \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ , îi corespunde un unic punct  $P \in AB$ .
- ▶ **Definiție** Scalarul  $r$  definit în lema anterioară se numește **raportul** punctelor  $A, B, P$  (sau **raportul în care punctul  $P$  împarte segmentul  $[AB]$** ) și este notat cu  $r(A, P, B)$ .
- ▶ **Observație importantă.** În calcularea raportului, ordinea punctelor este esențială. Modul în care este definită această noțiune (mai precis ordinea în care sunt considerate punctele) diferă de la autor la autor.

## Exemple

- (i) În  $\mathbb{R}^3$  considerăm punctele  $A = (1, 2, 3)$ ,  $B = (2, 1, -1)$ ,  $C = (0, 3, 7)$ .  
Atunci punctele  $A, B, C$  sunt coliniare și avem  $r(A, C, B) = -\frac{1}{2}$ ,  
 $r(B, C, A) = -2$ ,  $r(C, A, B) = 1$ ,  $r(C, B, A) = -2$ .
- (ii) Fie  $A, B$  două puncte din  $\mathbb{R}^n$  și  $M = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$ . Atunci  
 $r(A, M, B) = 1$ ,  $r(M, A, B) = -\frac{1}{2}$ .

# Legătura dintre raport și combinații afine. Interpretare

► **Propoziție** Fie  $A, B, P$  trei puncte coliniare, cu  $P \neq B$ . Atunci:

(i)  $P = \frac{1}{r+1}A + \frac{r}{r+1}B$ , unde  $r = r(A, P, B)$ ;

(ii)  $P = (1 - \alpha)A + \alpha B$  dacă și numai dacă  $r(A, P, B) = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ ;

(iii)  $P = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}A + \frac{\beta}{\alpha+\beta}B$  dacă și numai dacă  $r(A, P, B) = \frac{\beta}{\alpha}$ .

# Legătura dintre raport și combinații afine. Interpretare

► **Propoziție** Fie  $A, B, P$  trei puncte coliniare, cu  $P \neq B$ . Atunci:

(i)  $P = \frac{1}{r+1}A + \frac{r}{r+1}B$ , unde  $r = r(A, P, B)$ ;

(ii)  $P = (1 - \alpha)A + \alpha B$  dacă și numai dacă  $r(A, P, B) = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ ;

(iii)  $P = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}A + \frac{\beta}{\alpha+\beta}B$  dacă și numai dacă  $r(A, P, B) = \frac{\beta}{\alpha}$ .

► **Observație.** Fie  $P \in AB \setminus \{A, B\}$ . Atunci:

(i)  $r(A, P, B) > 0$  dacă și numai dacă  $P \in (AB)$ ;

(ii)  $r(B, P, A) = \frac{1}{r(A, P, B)}$ .

## Coordonate carteziene și coordonate polare


- ▶ Coordonate carteziene  $(x, y)$  și coordonate polare  $(\rho, \theta)$  (pentru puncte din planul  $\mathbb{R}^2$  pentru care relațiile au sens):

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \end{cases}$$


## Coordonate carteziene și coordonate polare

- Coordonate carteziene  $(x, y)$  și coordonate polare  $(\rho, \theta)$  (pentru puncte din planul  $\mathbb{R}^2$  pentru care relațiile au sens):

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \end{cases}$$



# Motivație



Poziția relativă a două puncte față de un vector / o muchie orientată

## Produs vectorial & aplicații

- ▶ Fie vectorii  $v = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbf{R}^3$ .

**Produsul vectorial**  $v \times w$  se calculează dezvoltând **determinantul formal**

$$v \times w = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 & e_1 \\ v_2 & w_2 & e_2 \\ v_3 & w_3 & e_3 \end{vmatrix}$$



## Produs vectorial & aplicații

- Fie vectorii  $v = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbf{R}^3$ .

**Produsul vectorial**  $v \times w$  se calculează dezvoltând **determinantul formal**

$$v \times w = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 & e_1 \\ v_2 & w_2 & e_2 \\ v_3 & w_3 & e_3 \end{vmatrix}$$

- **Notație** Fie  $P = (p_1, p_2)$ ,  $Q = (q_1, q_2)$  două puncte distincte din planul  $\mathbf{R}^2$ , fie  $R = (r_1, r_2)$  un punct arbitrar. Notăm

$$\Delta(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix}.$$

## Produs vectorial & aplicații

- Fie vectorii  $v = (v_1, v_2, v_3)$ ,  $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbf{R}^3$ .

**Produsul vectorial**  $v \times w$  se calculează dezvoltând **determinantul formal**

$$v \times w = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 & e_1 \\ v_2 & w_2 & e_2 \\ v_3 & w_3 & e_3 \end{vmatrix}$$

- **Notăție** Fie  $P = (p_1, p_2)$ ,  $Q = (q_1, q_2)$  două puncte distincte din planul  $\mathbf{R}^2$ , fie  $R = (r_1, r_2)$  un punct arbitrar. Notăm

$$\Delta(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix}.$$

- **Lemă.** Fie  $P, Q, R$  puncte din  $\mathbf{R}^2 \simeq \{x \in \mathbf{R}^3 \mid x_3 = 0\}$ . Atunci

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (0, 0, \Delta(P, Q, R)).$$

## Enunț principal

- **Propoziție.** Fie  $P = (p_1, p_2)$ ,  $Q = (q_1, q_2)$  două puncte distincte din planul  $\mathbf{R}^2$ , fie  $R = (r_1, r_2)$  un punct arbitrar și

$$\Delta(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix}.$$

Atunci  $R$  este situat:

- (i) pe dreapta  $PQ \Leftrightarrow \Delta(P, Q, R) = 0$  ("ecuația dreptei");  
 (ii) "în dreapta" segmentului orientat  $\overrightarrow{PQ} \Leftrightarrow \Delta(P, Q, R) < 0$ ;  
 (iii) "în stânga" segmentului orientat  $\overrightarrow{PQ} \Leftrightarrow \Delta(P, Q, R) > 0$ .

## Enunț principal

- **Propoziție.** Fie  $P = (p_1, p_2)$ ,  $Q = (q_1, q_2)$  două puncte distincte din planul  $\mathbf{R}^2$ , fie  $R = (r_1, r_2)$  un punct arbitrar și

$$\Delta(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix}.$$

Atunci  $R$  este situat:

- (i) pe dreapta  $PQ \Leftrightarrow \Delta(P, Q, R) = 0$  ("ecuația dreptei");  
 (ii) "în dreapta" segmentului orientat  $\overrightarrow{PQ} \Leftrightarrow \Delta(P, Q, R) < 0$ ;  
 (iii) "în stânga" segmentului orientat  $\overrightarrow{PQ} \Leftrightarrow \Delta(P, Q, R) > 0$ .
- **Obs.** Testul de orientare se bazează pe calculul unui polinom de gradul II ( $\Delta(P, Q, R)$ ).

# Aplicații

- ▶ dacă un punct este în dreapta / stânga unei muchii orientate;

# Aplicații

- ▶ dacă un punct este în dreapta / stânga unei muchii orientate;
- ▶ natura unui viraj în parcurgerea unei linii poligonale (la dreapta / la stânga);

# Aplicații

- ▶ dacă un punct este în dreapta / stânga unei muchii orientate;
- ▶ natura unui viraj în parcurgerea unei linii poligonale (la dreapta / la stânga);
- ▶ natura unui poligon (convex / concav);

# Aplicații

- ▶ dacă un punct este în dreapta / stânga unei muchii orientate;
- ▶ natura unui viraj în parcurgerea unei linii poligonale (la dreapta / la stânga);
- ▶ natura unui poligon (convex / concav);
- ▶ dacă două puncte sunt de o parte și de alta a unui segment / a unei drepte.